

(AS XXV) = 1933 L

Typusmaterial, Originale und Belege zu

F. v. HUENE (1935 - 1942) : Die fossilen Reptilien  
des Südamerikanischen Gondwanalandes.

Ergebnisse der Sauriergrabungen in Südbrasilien  
1928/29.-

München 1935 - 1942 (C. H. Beck).

1. *Prestosuchus chiniquensis* v. HUENE 1942; Linker Unterkieferast;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 161, Fig. 28; Taf. 18, Fig. 3 a,b
2. *Prestosuchus chiniquensis*; Rechte Scapula;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 18, Fig. 4 page 171
3. *Prestosuchus chiniquensis*; Letzter Sacralwirbel, Schwanzwirbel 1-6,  
linkes Ilium und beide Ischia;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 18, Fig. 5,6; Taf. 19, Fig. 2,4 page 169
4. *Prestosuchus* (?) *loricatus* v. HUENE 1942; Neuralbogen eines vorderen  
Rückenwirbels;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria.  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 18, Fig. 7 page 191
- 5a-d.  
*Prestosuchus chiniquensis*; Bauchrippen (4 Teilstücke);  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 19, Fig. 1 page 168
6. *Prestosuchus chiniquensis*; Beide Pubis ohne Proximalende;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 19, Fig. 3 page 176
7. *Prestosuchus chiniquensis*; Oberer Teil des Ilium, beide Sacralrippen,  
Dornfortsätze beider Sacralwirbel und des letzten Rückenwirbels,  
dorsale Panzerplatten;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Paratypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 19, Fig. 5 a,b page 183
8. *Prestosuchus chiniquensis*; Kopf einer linken mittleren Dorsalrippe  
ohne Tuberculum;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 20, Fig. 1 page 167

9. *Prestosuchus chiniquensis*; Mittleres Dorsalrippenstück;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 20, Fig. 2 page 168
10. *Prestosuchus chiniquensis*; Linker Femur;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 20, Fig. 3 page 177
- 11a-l.  
*Prestosuchus chiniquensis*; Linke Tibia, Fibula u. Fuß;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 20, Fig. 4 a,b; Taf. 21, Fig. 2 a,b page 177
12. *Prestosuchus chiniquensis*; Brust-Schultergürtel;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 21, Fig. 1 a,b page 170
13. *Prestosuchus loricatus* v. HUENE 1942; Neuralbogen eines Halswirbels;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23. Fig. 1 a,b #13a page 186; #13b page 187
14. *Prestosuchus loricatus*; Neuralbogen eines mittleren Schwanzwirbels;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 2 page 188
15. *Prestosuchus loricatus*; Zentrum eines mittleren Schwanzwirbels;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 3 page 188
16. *Prestosuchus loricatus*; Distaler Schwanzwirbel;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 4 page 189
17. *Prestosuchus loricatus*; Distaler Schwanzwirbel;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 5 page 189

18. *Prestosuchus loricatus*; Teil einer hinteren linken Halsrippe ohne Capitulum;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 6 [page 186](#)
19. *Prestosuchus loricatus*; Proximale Hälfte einer vorderen linken Halsrippe;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 7 [page 188](#)
20. *Prestosuchus loricatus*; Zahnspitze;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 8 [page 186](#)
- 21a,b.  
*Prestosuchus loricatus*; Zwei rechte Dorsalrippen;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 10 [page 188](#)
22. *Prestosuchus loricatus*; Beide Ischiumstiele;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 11 a,b [page 189](#)
23. *Prestosuchus loricatus*; Distale Hälfte eines Metatarsale;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 12 [page 190](#)
24. *Prestosuchus loricatus*; Rechte Fibulare;  
Santa-Maria-Formation? ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 13 a,b [page 190](#)
25. *Prestosuchus* (?) *loricatus*; Rechte Fibulare;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 14 [page 191](#)
- 26a,b  
*Prestosuchus loricatus*; Rückenpanzerplatten;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 16 [page 190](#)



27. *Prestosuchus loricatus*; Rückenpanzerplatten;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Syntypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 23, Fig. 17 a,b page 190
28. *Prestosuchus chiniquensis*; Fragment der rechten Praemaxilla usw. ;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt. Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 163, Fig. 29 a-d
29. *Prestosuchus chiniquensis*; Zentrum des letzten Halswirbels;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 165, Fig. 30 a,b
30. *Prestosuchus chiniquensis*; Fragment eines hinteren Halswirbels;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 166, Fig. 31 a,b page 165
31. *Prestosuchus chiniquensis*; Teile von zwei vorderen Rückenwirbeln;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 166, Fig. 32
- 32a,b  
*Prestosuchus chiniquensis*; Zentrum von distalen Schwanzwirbelen mit  
Haemapophysen, Schwanzwirbel-Zentrum;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Original zu v. HUENE (1942): S. 170, Fig. 34
33. *Prestosuchus chiniquensis*; Oberende des linken Humerus;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 173, Fig. 35
34. *Prestosuchus chiniquensis*; Oberende des rechten Humerus;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 173, Fig. 36
35. *Prestosuchus chiniquensis*; Distales Fragment des rechten Humerus;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): S. 174, Fig. 37

36 - 41.

? Prestosuchus chiniquensis; **Klaue**, 2 Phalangen, **3** Abdominalrippen-Fragm.;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien.

Belege zu v. HUENE (1942): S. **185** #36-39: page 185

42. Prestosuchus (?) loricatus; Rückenwirbelzentrum;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien.

Beleg zu v. HUENE (1942): S. **190**

43. **?** Prestosuchus loricatus **?**; Scapula-Fragment;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien.

Beleg zu v. HUENE (1942): S. **189**

44. Prestosuchus loricatus; **Panzerplatte**;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien. page 190

45. Prestosuchus loricatus; Rückenwirbel-Fragment;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien.

Beleg zu v. HUENE (1942): S. **187**

**46a-1.**

Prestosuchus loricatus; diverse Skelett-Fragmente;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien. page ?189, "Ein isolierter Dornfotsatz" page 168

**47,48.**

Prestosuchus loricatus; **Zwei Wirbel-Fragmente**;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien. #47 page 188; #48 page 189

**49.** Prestosuchus loricatus; Dorsalrippenstück;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquà b. Santa Maria,  
Südbrasilien.

(AS XXV) = 1933 L

,

131. *Procerosuchus celer* v. HUENE 1942; Rechtes Pterygoid m. Querflügel;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria,  
Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 28, Fig. 4 a,b

132. *Procerosuchus celer*; Hinterende des rechten Jugale, Fragment des rechten Squamosum;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 28, Fig. 5 a,b
133. *Procerosuchus celer*; Hinterende des linken Praevomer;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 28, Fig. 6
134. *Procerosuchus celer*; Brust-Schultergürtel beider Seiten und linker Unterarm, Fragment der linken Scapula;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 29, Fig. 1
135. *Procerosuchus celer*; Linker Humerus;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 29, Fig. 2
136. *Procerosuchus celer*; Distale Hälfte des rechten Femur m. vollständiger Tibia u. Fibula;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 29, Fig. 3
137. *Procerosuchus celer*; Distale Hälfte der linken Tibia;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 29, Fig. 4
138. *Procerosuchus celer*; Distale Hälfte der linken Fibula;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 29, Fig. 5
139. *Procerosuchus celer*; Fragmente der Metatarsale II u. III;  
Santa-Maria-Formation, ob. Abt., Ladin; Chiniquã b. Santa Maria, Südbrasilien.  
Holotypus u. Orig. zu v. HUENE (1942): Taf. 29, Fig. 6